

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Куртикола[®] при воспалительных заболеваниях кожи у собак, кошек, декоративных грызунов и кроликов

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Куртикол[®] (Kurtikol[®]).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Куртикол[®] в качестве действующих веществ содержит матричные настойки природного происхождения (в 1000 мл): Arnica montana - 10 мкл, Atropa belladonna - 2 мкл, Apis mellifica - 0,01 мкл, Hamamelis virginiana - 3 мкл, Urtica urens - 0,002 мкл, Bellis perennis - 2 мкл, вспомогательные вещества натрия хлорид 9,0 г и воду для инъекций до 1000 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

3. Выпускают Куртикол[®] стерильно расфасованным по 10 и 50 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковываются в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

4. Куртикол[®] хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 24 часа. Куртикол[®] запрещается применять по истечении срока годности.

5. Куртикол[®] следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Куртикол[®] относится к комбинированным лекарственным препаратам. Ингибирует выработку провоспалительных цитокинов, оказывает противовоспалительное и противозудное действие при воспалении кожных покровов.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Куртикол[®] назначают собакам, кошкам, декоративным грызунам и кроликам для лечения воспалительных заболеваний кожи различного генеза, в том числе атопического, аллергического, контактного дерматита, а также в комплексной терапии вторичной пиодермии.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

10. Куртикол[®] применяют животным внутримышечно или подкожно 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней, при лечении атопического дерматита 2 раза в сутки в течение 5-7 дней, затем 1 раз в сутки в течение 14 дней в следующих дозах:

- грызунам – 0,2-0,3 мл/животное
- собакам, кошкам, кроликам – 0,1 мл/кг массы животного.

11. Симптомы передозировки у животных не установлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлены.

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

14. При применении Куртикола[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций, использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии

15. Применение Куртикола[®] не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

16. Куртикол[®] не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Куртиколом[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Куртикола[®] следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13.

Место производства: 147000, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13.

Инструкция разработана: ООО «АлексАнн» (141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13.).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения