ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата УроПро

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения Республики Беларусь 8576-10-23 ЗПХ-Ф

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: **УроПро (UroPro)**.

Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстанций: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

В 1,0 мл препарата содержится глюкозамин (в пересчете на глюкозамина сульфат) – 60 мг, экстракт клюквы – 18 мг (содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 0,8 мг/г), экстракт толокнянки – 3 мг (содержание арбутина не менее 0,05 мг/г), D-маннозы – 360 мг и вспомогательные вещества (гидроксиэтилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоата натриевая соль, вода очищенная) до 1,0 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-красно-коричневого до красно-коричневого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 6 месяцев. **УроПро** запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают **УроПро** расфасованным по 30 и 120 мл в полимерные флаконы с винтовой горловиной, комплектуемые полимерными навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия и пробкой-адаптером. Каждый флакон поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению и комплектуют полимерным оральным шприцем – дозирующим приспособлением (шприцем-дозатором), предназначенным для измерения предписанного объёма.

5. **УроПро** хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.

6. **УроПро** следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. **УроПро** относится к лекарственным препаратам – уропротекторам, применяемым при мочекаменной болезни и цистите.

10. Фармакологические свойства **УроПро** обусловлены действием компонентов, входящих в его состав.

Глюкозамин (Glucosaminum) является предшественником гликозаминогликанов, входящих в состав внеклеточного ложа слизистой оболочки нижних мочевых путей. Глюкозамин способствует восстановлению гликозаминогликанового слоя в уротелии при воспалительных процессах в мочевом пузыре и мочевыводящих путях.

Химическая структура *D-маннозы* позволяет ей связываться с маннозочувствительными фимбриями уропатогенных бактерий, препятствуя их адгезии к слизистой мочевыводящих путей. В результате уропатогенные бактерии выводятся с мочой, не оказывая негативного воздействия на мочевыводящую систему.

Экстракт клюквы (Vaccinum macrocarpon) содержит рутин и проантоцианидин, который, связываясь с поверхностными рецепторами патогенных бактерий, инактивирует фимбрии и адгезины. Отсутствие фимбриальной адгезии препятствует прилипанию бактерий к клеткам эпителия мочевой системы.

Экстракт толокнянки обладает мочегонным, противовоспалительным и противомикробным действием. Из фенольных гликозидов толокнянки – арбутина и метиларбутина под действием фермента арбутазы высвобождается гидрохинон. Выделяясь с мочой, гидрохинон усиливает мочеотделение и оказывает антисептическое действие. Противовоспалительные свойства толокнянки обусловлены высоким содержанием дубильных веществ.

Вспомогательные вещества способствуют стабильности готовой лекарственной формы.

По степени воздействия на организм препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

11. **УроПро** применяют кошкам и собакам для профилактики и в комплексной терапии при мочекаменной болезни, остром и хроническом уроцистите, для восстановления слизистой оболочки мочевого пузыря и мочевыводящих путей при оперативных вмешательствах на мочевом пузыре и мочевыводящих путях, в т.ч. при уретростомии.

УРОП.236ПРС.И



12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с **УроПро** следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам **УроПро** следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат разрешен к применению беременным, лактирующим самкам и молодняку.

15. **УроПро** вводят животным перорально в следующих дозах:

- кошкам – 1 мл/животное один раз в сутки в течение 7-14 дней;

- собакам – 1 мл/10 кг массы тела один раз в сутки в течение 7-14 дней.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

В редких случаях возможны аллергические реакции. При возникновении аллергических реакций препарат необходимо отменить, назначить антигистаминные препараты и, при необходимости, симптоматические средства.

17. Симптомов передозировки препарата не установлено.

18. Информация о взаимодействии **УроПро** с лекарственными препаратами других групп отсутствует.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом приеме и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13

УРОП.236ПРС.И