
**СОВРЕМЕННЫЙ • ЭФФЕКТИВНЫЙ**
**ГАСТРОПРОТЕКТОР ДЛЯ ЖИВОТНЫХ**


# ГАСТРОПРО®

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ **ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ГАСТРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** создает защитный барьер, ингибирует действие пепсина и желчи, стимулирует репаративные процессы в слизистой, блокирует адгезию H. pylori, обладает тропностью к пораженной слизистой
- ✓ **ЗАЩИЩАЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ СЛИЗИСТУЮ ЖКТ,** не влияет на кислотность и быстро устраняет болезненные ощущения у животных с проблемами ЖКТ
- ✓ **СУКРАЛЬФАТ 10%** – оптимальная концентрация для плотоядных, позволяющая обеспечить равномерное распределение препарата по всей слизистой желудка
- ✓ **МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК** кумуляции алюминия, нетоксичен
- ✓ **МОЖНО** применять длительными курсами





**СУКРАЛЬФАТ**



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.


# МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

## Сукральфат





В кислой среде желудка
**(при pH ниже 4)**
сукральфат распадается
на алюминий и сульфат сахарозы

## 1 Формирование защитного слоя




Алюминий денатурирует белки слизи, а сульфат сахарозы соединяется с ними, фиксируется на некротических массах язвенного поражения, образует защитную пленку, создавая барьер для действия пепсина, соляной кислоты и забрасываемой желчи.


## 2 Механический барьер



- ✓ Снижает раздражение
- ✓ Уменьшает воспаление
- ✓ Способствует восстановлению слизистой

Защитная плёнка механически прикрывает эрозированную слизистую, уменьшая контакт с соляной кислотой, пепсином и желчными кислотами. Это снижает раздражение, воспаление и способствует полноценному восстановлению слизистой.

## 3 Выраженное протективное действие при поврежденной слизистой H. pylori



- ✓ Снижает адгезию H. pylori
- ✓ Уменьшает воспаление
- ✓ Способствует восстановлению слизистой

## 4 Продолжительность защитного действия



**6-8**
**часов**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

**Защищает и восстанавливает слизистую оболочку ЖКТ**

Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повреждением слизистой оболочки:

- ✓ **ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ГАСТРИТЫ**
- ✓ **ГАСТРОДУОДЕНИТЫ**
- ✓ **ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**
- ✓ **РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТ**
- ✓ **МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖКТ НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ, ПРИЕМА НПВС, ГКС**
- ✓ **СТРЕССОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖКТ**
- ✓ **ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ, ХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ЖКТ**



**ГАСТРОПРО®**

| ЗАЩИЩАЕТ | СПОСОБСТВУЕТ | УМЕНЬШАЕТ | ПОВЫШАЕТ |
|---|---|---|---|
| от агрессивных факторов | восстановлению слизистой | боль, воспаление и дискомфорт | эффективность терапии |

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

## ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

**ГАСТРОПРО®** применяют собакам и кошкам перорально 2-3 раза в день, продолжительность курса лечения составляет 10-14 дней.

| | | |
|---|---|---|
|  | **СОБАКАМ КРУПНЫХ ПОРОД** массой **свыше 20 кг** | **5-10 мл** (0,5-1 г сукральфата на животное) |
|  | **СОБАКАМ СРЕДНИХ ПОРОД** массой **10-20 кг** | **5 мл** (0,5 г сукральфата на животное) |
|  | **КОШКАМ И СОБАКАМ МЕЛКИХ ПОРОД** массой **менее 10 кг** | **1,25-2,5 мл** (0,125-0,25 г сукральфата на животное) |

**ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ НАТОЩАК, ЗА 30-60 МИНУТ ДО КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНОГО*.**

В течение одного часа после применения препарата не рекомендуется приём корма и других лекарственных средств во избежание нарушения адгезивной активности сукральфата и снижения терапевтического эффекта.

*Перед употреблением препарат необходимо интенсивно встряхнуть несколько раз, затем набрать в шприц-дозатор.

**Регистрационный номер:** 32-3-11.26-5554№ПВР-3-11.26/04149

Производитель: ООО «АлексАнн» 8 (495) 221-01-58 doctor@cellprotection.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МОСЗООВЕТСНАБ МЫ РЯДОМ, ЗАБОТЯСЬ О ГЛАВНОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.