# МЕТОМЕНОЛ®

**раствор для инъекций**

Неопиоидный ненаркотический анальгезирующий препарат центрального действия для купирования выраженного болевого синдрома у собак




**ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ БОЛИ ЛЮБОГО ГЕНЕЗА**

Безопасность. Эффективность.
Комфортная жизнь без боли.

**Состав:**

**в 1 мл – 5 мг тиохроменола**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Препарат показан для симптоматического лечения умеренного и выраженного болевого синдрома различной этиологии у собак, в том числе:



### ОСТРЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

хирургические вмешательства и травмы

### ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

онкологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата

### НЕВРОПАТИЧЕСКИЕ БОЛИ

повреждение позвоночника

### КУПИРОВАНИЕ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ БОЛИ

при остром панкреатите, воспалительных заболеваниях ЖКТ, спастических сокращениях кишечника, патологиях мочевыводящей системы

### ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРЕМЕДИКАЦИИ

> **МЕТОМЕНОЛ®** – современный подход к обезболиванию: эффективность, безопасность и комфорт для каждого пациента.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**ТИОХРОМЕНОЛ** воздействует на каннабиноидные **$CB_1$**-рецепторы, дофаминовые **$D_1$**- и **$D_2$**-рецепторы (агонист), снижает активность ноцицептивной и повышает активность антиноцицептивной системы организма.

Опиоидные рецепторы не вовлечены в реализацию анальгетического эффекта, в связи с чем побочные эффекты, свойственные наркотическим анальгетикам, у тиохроменола не проявляются.

При подкожном введении **ТИОХРОМЕНОЛ** быстро проникает из места инъекции в системный кровоток, обнаруживается в плазме крови животных спустя 15-30 минут после введения препарата.

Максимальная концентрация **ТИОХРОМЕНОЛА** в плазме крови собак достигается через 2-3 часа, среднее значение $C_{max}$ 16,7 нг/мл.

Период полувыведения **(T1/2)** из плазмы крови составляет – **17,6 часов**, среднее время удержания препарата в организме – **24,4 часа**.

**ТИОХРОМЕНОЛ** не метаболизируется, выводится через печень и почки в неизменном виде.

У пациентов с нарушенной функцией почек период полувыведения препарата может быть увеличен.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Анальгетический потенциал **МЕТОМЕНОЛА®** составляет 0,5 от активности морфина
- Высокий профиль безопасности
- Подходит для применения животным с непереносимостью НПВС
- Возможно применять беременным и кормящим самкам, а также щенкам моложе 6-месячного возраста
- Не вызывает толерантности и зависимости
- Действует до 24 часов
- Отпускается без рецепта

## ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ



**ДОЗИРОВКА**

**0,1-0,2 мл/кг**

(0,5-1 мг тиохроменола на 1 кг массы тела)

**ПОДКОЖНО**

**КРАТНОСТЬ**

**1-2 раза в сутки**

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА**

**1-9 дней**



Доза устанавливается индивидуально в зависимости от интенсивности болевого синдрома и реакции животного.

Возможно применение препарата в составе мультимодальной аналгезии в послеоперационный период и для премедикации.

АлексАнн

Производитель:
ООО «АлексАнн»

8 (495) 221-01-58

МО, г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

http://aleksann.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.